

兴齐美欧品® (0.01%硫酸阿托品滴眼液)是儿童青少年近视管理的基础用药



单药有效

单独使用延缓近视进展60%<sup>1</sup>  
获得国内外指南共识一致推荐



长期安全

连续使用10年未见严重不良反应<sup>2</sup>



联合增效

初始联合OK镜进一步延缓眼轴增长28%<sup>3</sup>, 初始联合离焦眼镜延缓眼轴增长77%<sup>4</sup>



舒适稳定

源自新加坡, 兴齐独家  
MYOSTAFORT®稳适®创新技术,  
点眼舒适, 制剂稳定, 无防腐剂

兴齐美欧品® 简明处方

- 【药品名称】** 通用名称:硫酸阿托品滴眼液
- 【成份】** 活性成份:硫酸阿托品
- 【性状】** 无色澄明液体
- 【适应症】** 本品用于延缓球镜度数为-1.00D至-4.00D (散光≤1.50D、屈光参差≤1.50D) 的6至12岁儿童的近视进展。
- 【规格】** 0.01% (0.4ml:0.04mg)
- 【用法用量】** 一次1滴, 一日1次, 睡前滴入结膜囊内。请在眼科医生指导下使用。点眼后应立即压迫内眦泪囊部2~3分钟, 以减少药物的全身吸收。
- 【不良反应】** 常见眼痛、畏光、干眼、眼睛瘙痒、结膜乳头、变应性结膜炎、视物模糊, 其他请详见说明书。
- 【禁忌】** 青光眼或有青光眼倾向的患者禁用。对莨菪类生物碱过敏者禁用。对本品任何成分过敏者禁用。
- 【注意事项】** 儿童脑外伤者、圆锥角膜患者、虹膜粘连患者慎用。既往对阿托品有严重全身反应的儿童不应使用本品。据报道, 患有唐氏综合症、痉挛性麻痹或脑损伤的儿童对阿托品的易感性增加, 应慎用本品。其他请详见说明书。
- 【贮藏】** 遮光, 密封, 不超过25℃保存。
- 【有效期】** 18个月
- 【批准文号】** 国药准字 H20243320

参考文献:  
1.Chia, A et al. Ophthalmology, 2016;123(2):391-399  
2.Chuang MN, et al. Sci Rep. 2021 Aug 30;11(1):17344.  
3.Kinoshita N, et al. Sci Rep. 2020 Jul 29;10(1):12750.  
4.Nucci P, et al. PLoS One. 2023;18(2):e0281816.

仅供医疗专业人士参考  
审批号: YXNRSPLC-20240320-002  
有效期至2024年12月31日



联合增效


兴齐美欧品® (0.01%硫酸阿托品滴眼液)

初始联合OK镜进一步延缓眼轴增长28%  
初始联合离焦眼镜延缓眼轴增长77%

控近视  
兴未来




## 阿托品滴眼液与光学手段机制协同增效<sup>1</sup>



## 初始联合OK镜可以进一步延缓眼轴增长28%<sup>2</sup>

- 与单独使用OK镜相比，0.01%阿托品滴眼液初始联合OK镜控制眼轴增长效果更优，**疗效进一步提升28%**




- 一项为期2年的随机试验，纳入80例8-12岁近视儿童，分别接受角膜塑形镜 (单独使用组) 和 0.01% 阿托品溶液的联合角膜塑形镜治疗 (联合治疗组)，共73例受试者完成试验

参考文献:  
1. Sánchez-González JM, et al. J Clin Med. 2020 Jul 24;9(8):2371.  
2. Kinoshita N, et al. Sci Rep. 2020 Jul 29;10(1):12750.

## 初始联合离焦眼镜延缓眼轴增长77%


- 与对照组相比，0.01%阿托品滴眼液初始联合DIMS控制眼轴增长效果更优，**疗效可达77%**



- 一项非随机、前瞻性、对照观察研究，纳入146例近视儿童，旨在评估0.01%阿托品滴眼液、多区正向光学离焦眼镜 (DIMS)、0.01%阿托品滴眼液+DIMS控制近视进展的疗效，受试者随机分配接受单光眼镜 (对照组, n=32)、DIMS (n=30)、0.01%阿托品滴眼液 (n=53) 或0.01%阿托品滴眼液+DIMS联合治疗 (n=31)<sup>1</sup>

## 低浓度阿托品滴眼液联合OK镜延缓近视进展疗效良好，安全可控

- 与单独使用OK镜相比，0.01%阿托品滴眼液+OK镜可显著延缓眼轴长度和等效球镜增长，除增加瞳孔直径外，对调节幅度、眼压、泪膜破裂时间和角膜内皮细胞密度等并无影响




- 一项meta分析纳入15项研究，共969例近视受试者，旨在研究低浓度阿托品滴眼液+OK镜 (n=479) vs 单独OK镜 (n=490) 延缓近视进展的有效性和安全性<sup>2</sup>

## 0.01%阿托品滴眼液使用方法<sup>3</sup>

- 0.01%阿托品滴眼液每天一次，每次一滴，每晚睡前滴入结膜囊内
- 单支包装的0.01%阿托品滴眼液无防腐剂，建议打开使用后立即丢弃

**先点0.01%阿托品滴眼液，约15分钟后戴镜**



参考文献:  
1. Nucci P, et al. PLoS One. 2023 Feb 16;18(2):e0281816.  
2. Zheng NN, et al. Ophthalmic Physiol Opt. 2022 Nov;42(6):1214-1226.  
3. 中华医学会儿科学分会眼科学组, 等. 低浓度阿托品滴眼液在儿童青少年近视防控中的应用专家共识(2022)[J]. 中华眼视光学与视觉科学杂志, 2022, 24(06):401-409.